

WAARSCHIJNLIJK BROEDGEVAL VAN DE CETTI'S ZANGER IN HET NATUURRESERVAAT CANISVLIET TE SAS VAN GENT (Z-VL.)

A probable breeding case of the Cetti's Warbler near Sas van Gent (Z-VL.)

J. J. VAN DEN STEEN

Op 11 en 25 november 1972 hoorde ik voor het eerst in het natuurreservaat Canisvliet nabij Sas van Gent (Z-VL.) de verhakkelde zang (sub-song) van de Cetti's Zanger. Deze zang hoorde ik ook op 27 januari, 3 en 11 februari 1973. Ik kreeg de vogels echter niet te zien. Op 16 en 23 maart 1974 hoorde ik hem opnieuw maar met een meer volledige zang en vanaf 30 maart 1974 zong hij onafgebroken tot half juni zijn helder zeer welluidend tsjewie (explosief) — tsjè-tsjietsjowieoe-wie, soms twee tot drie maal herhaald, waarna de zang afnam alhoewel ik hem tot ver in september nog diverse malen hoorde. Op 25 mei 1974 werd van deze zang een bandopname gemaakt.

Het gebied waar hij verbleef was een oevergedeelte van een uitloper van de Canisvlietkreek bestaande uit een brede riet- en risdoddekraag overgaande in een verlandingszone met Liesgras, Wilg e.d. en aansluitend op een bebos-sing bestaande uit Meidoorn, Sleedoorn enz. Daartussen een dichte onder-begroeiing van voornamelijk manshoge Grote Brandnetel. Op 26 april 1974 hoorde ik hem volop zingen en zag tegelijkertijd een tweede vogel die ik onmiddellijk determineerde als Cetti's Zanger. Ik kreeg de vogel op ± 8 meter goed in de kijker (7×50) en lang genoeg om te zien dat hij ietsje groter was dan de Kleine Karekiet. Hij was voller en minder slank met on-opvallende kenmerken, vuil-grijze onderdelen, donkerbruin rossige bovendelen vooral de zijden van de rug, ietsje donkere kopkap, klein vuil-grijs oogstreepje in ronde kop, klein snaveltje, vrij korte rafelige afgeronde staart welke ook aan de onderzijde en voornamelijk aan het eind van de buitenste staartpennen donker was. In voorkomen en gedrag zit hij zo tussen de *Acrocephalus* en *Sylvia* soorten in, met dien verstande dat hij zich vrijwel steeds verborgen houdt en moeilijk is waar te nemen.

Op 15 mei, 8 juni en 19 juli deed ik vruchteloze pogingen het nest te vinden. Bij deze laatste poging hoorde ik plots, buiten de normale zang, een roep als „rititie-titerietitie”, een steeds herhaald agressief scherpe lange zeer vlugge metaalachtige hoge ratel wel wat lijkend op de alarmroep van de Winterkoning, maar dan met een hogere en scherpere i klank en nog veel driftiger voorgedragen. Tezelfder tijd kreeg ik de vogel op nog geen 5 meter van mij af te zien op een laag afhanginge binnentak van een Wilg en ik zag onmiddellijk dat het de Cetti's Zanger was. Ik kon hem steeds ratelend gedurende een tweetal minuten observeren en alle kenmerken vastleggen waarbij mij nu ook de vleeskleurige lichte pootjes opvielen. De vogel naderde mij tot op 2 meter! Even zag ik ± 3 meter achter hem een vrij groot jong uit de wirwar te voorschijn komen en zag ik dat deze kleiner en valer was en, ook aan de bek te zien, dat het hier duidelijk een vrij groot jong van de Cetti's Zanger betrof. Intussen hoorde ik een steeds herhalend fijn vlug voorgedragen „siesiesiesie”,

welk geluid mij aan mezen deed denken welke echter niet in de buurt waren. Nadat de adulte vogel was verdwenen en ik de plaats waar ik het jong gezien had naderde, kwam hij opnieuw hevig ratelende te voorschijn waarbij ik, even vóór de ratel, een geluid als „tsjoek” hoorde.

Nadat alles weer stil was geworden herhaalde zich dit een twintigtal meter verder en ik zag toen even het nerveuze wijfje met voedsel in de bek (kleine rups).

De hele waarneming duurde van 9 tot 13 uur, er was zon, weinig wind en de temperatuur was $\pm 22^{\circ}\text{C}$.

Gezien de diverse broedgevallen van deze vogel in de noordelijke provincies van België zal ook een definitief broedgeval van deze vogel in Nederland niet lang meer op zich laten wachten.

Adres: Stevensstraat 18, Sas van Gent (Z-VI.).

OÖLOGISCHE EN NIDOLOGISCHE MEDEDELINGEN IN 1975 (EN EERDER)

W. Ph. J. HELLEBREKERS

Vroege broedsels van de Fuut *Podiceps cristatus*.

Op 11 februari 1975 bij Kortenhoeve een legsel van 4 eieren (medewaarnemer D. Spaan). Op 22 februari zag de heer IJ. Vogel twee jongen, leeftijd geschat op 10 dagen (deze waarneming heeft geen betrekking op de voorgaande mededeling), op 2 maart werden deze twee pulli ook waargenomen door de heer E. Boeve, deze schatte de leeftijd op 4 weken. De eieren zouden dan omstreeks half januari gelegd moeten zijn.

J. L. M. Bos

26 januari 1975 bij Noorden/Nieuwkoop een nest met één ei, kort daarop 4 (later slechts 2), begin februari nog een nest met één ei. Waarnemer D. Stam.

A. Hoogerwerf.

Januari 1975 bij Ankeveen nest met eieren, eerste week van februari jongen (Gooi en Eemlander van 27 maart).

Eind januari 1975 broedende Fuut bij Kortenhoeve (Gooi en Eemlander van 5 februari).

Late broedsels van het Waterhoen *Gallinula chloropus*.

Op 25 september 1974 tussen Oudegaai en Gaastmeer een exemplaar met 3 jongen van ongeveer een week oud (M. de Boer). Op 31 oktober 1974 bij Rosterhaule een nest met 4 eieren (K. Koopman). Ned. Vogels „tot in Augustus”. Beide gegevens in Vanellus 1975 p. 19.

H.

Vroege broedsels van de Meerkoet *Fulica atra*.

28 maart 1975 een broedend ex. in het Amsterdamse Bos, 29 maart nest