

gunstige gelegenheid ze te observeren. Toen na enige tijd de broedende vogel opstond, bleken minstens 3 eieren in het nest te liggen.

Op 10 mei werden met zekerheid 4 eieren geteld.

Aan het waarnemen van het gedrag der Roodhalsfuten op en in de omgeving van het nest werd daarna dagelijks door leden van Vogelwerkgroep Krimpenerwaard enige tijd besteed. Tevens werd een en ander gefotografeerd. Inmiddels was gebleken, dat ook enkele leden van Vogelwerkgroep Vlaardingen/Schiedam ongeveer gelijktijdig het broedgeval hadden ontdekt.

De geraadpleegde „Avifauna van Nederland” verschaftte informatie over een tweetal eerder vastgestelde broedgevallen: in 1918 in Brielle en in 1927 bij Kortenhoef. Voor zover bekend mogen we dus aannemen, dat de hier genoemde waarnemingen betrekking hebben op het derde broedgeval in deze eeuw van deze, voor ons land zeer zeldzame broedvogel.

Volledig geslaagd is deze derde broedpoging niet, want op Hemelvaartsdag (19 mei 1966) gingen bij stormachtige wind nest en eieren door golfslag verloren. De aanhoudende harde wind tijdens de daarop volgende dagen deed hernieuwde nestbouwopgingen mislukken. De hoop op eventueel succes verdween geheel, toen op 2 juni één der Roodhalsfuten dood op de plas werd aangetroffen. Het overgebleven ex. werd daarna nog regelmatig gezien; de laatste maal op 18 juni 1966.

P. Duiven.

#### SUMMARY:

*A new breeding-case of the Red-necked Grebe.*

In May 1966 a nest of the Red-necked Grebe was found in Rotterdam-East. This is the third case for the Netherlands.

#### *WAARNEMING VAN EEN RALREIGER (Ardeola ralloides) OP SCHOUWEN (\*\*).*

Op 20 augustus 1966 hebben wij op Schouwen ten W.N.W. van Renesse in de buurt van het „Watergat” een Ralreiger waargenomen. Een vriend, de heer A. C. de Jonge te Ellemeet, lid van de vogelwacht „Schouwen-Duiveland”, had mij een paar dagen van te voren telefonisch meegedeeld, dat hier een dwaalgast gesignaleerd was, het eerst door de heer L. Kouwen te Renesse, bestuurslid van bovengenoemde vogelwacht; de vogel moest volgens de heer De Jonge, die hem 16 en 19 augustus (de eerste maal samen met de heer Kouwen) al had gezien, een Koe- of een Ralreiger zijn.

Mijn vrouw, lid van de vogelwacht „Utrecht”, de heer De Jonge en ik waren 's morgens  $\pm$  half acht in het gebied, waar de vogel zich ophield. We kregen hem spoedig te zien, aan de rand van een weiland, aan drie zijden omzoomd met vrij laag geboomte (els en wilg in hoofdzaak) langs smalle sloten, gedeeltelijk begroeid met riet. De afstand bedroeg  $\pm$  100 m. We hadden de zon in de rug en de wind was N.O. (zwak). Het beeld van de vogel

(kijkers 7 x 50) was op genoemde afstand vrij duidelijk, behalve de kleur van snavel en poten. Het verenkleed was grotendeels vuilgeel met wit vleugelveld. Na enkele minuten vloog hij op en streek over het weiland naar de overkant, waar hij zich op aanmerkelijk korter afstand (60 à 65 m) neerliet. Het vliegbeeld was bijzonder mooi door de vrijwel sneeuwwitte vleugels en staart. Hals in S-bocht. Meer dan een half uur hebben we hem zeer goed kunnen waarnemen. Zo nu en dan verdween hij tussen de begroeiing langs het slootje, maar na korte tijd kwam hij telkens terug, eenmaal zichtbaar met een prooi. In verschillende standen en van alle zijden liet hij zich zien. Snavel en poten konden nu ook voldoende duidelijk worden waargenomen. Snavel: grijsachtig geel met een (vrij lange) zwarte punt; poten grijsachtig geel of groen, al naar 't licht er op viel. Enkele malen rekte hij de hals; het beeld was dan opvallend identiek met de foto in de vogelatlas van prof. Voous. Eenmaal poetste hij uitvoerig zijn veren. De kuif, die dan heen en weer slingerde, vertoonde een opvallende zwarte dunne streng. De gang van de vogel had veel overeenkomst met die van een Blauwe Reiger, die op proot loert: bedachtzaam schrijdend, misschien wat „deftiger”.

Dat we met een Ralreiger te doen hadden, was na deze uitvoerige en duidelijke waarneming buiten kijf.

Na ruim een half uur vloog hij terug naar de plaats, waar we hem het eerst zagen en daar verdween hij in een dichte begroeiing (riet met wilgen). Geruime tijd hebben we nog gewacht, maar hij kwam niet terug.

Op 21 augustus zijn mijn vrouw en ik zowel 's morgens als 's avonds opnieuw op zoek gegaan, maar zonder resultaat; de heer De Jonge zag hem evenmin op 23 aug., terwijl de ter plaatse wonende landbouwer, die hem 14 dagen lang had waargenomen, de vogel na 20 aug. ook niet meer had gezien.

J. S. Sybrandy.

#### SUMMARY:

##### *New record of the Squacco Heron*

In August 1966, a Squacco Heron stayed in the island of Schouwen, Province of Zeeland, for at least 5 days.

---

#### *EEN BROEDGEVAL VAN DE KWAK (Nycticorax nycticorax) BIJ RIJSWIJK (G.) IN 1966.*

Op 4 september 1966 n.m. bevond ik mij bij de steenfabriek „De Roodvoet” onder Rijswijk (Gld.), waar het terrein een oude rivierbocht en enkele tichelgaten omvat. Bij werkzaamheden aan de Rijn ter hoogte van deze steenfabriek is er in dit gebied bagger opgespoten, waardoor in de herfst van 1965 het waterpeil flink steeg. Het complex, dat dicht begroeid is met ca 10 jaar oud, sterk verwilderd, wilgenbos stond daardoor in het water en vormde zo een zeer aantrekkelijk rust- zowel als fourageergebied voor het waterwild.