

een vogel, waarvan wij menen te moeten vaststellen, dat het een Cettis Zanger *Cettia cetti* is geweest. Reeds toen wij de vogel in het mistnet zagen hangen, vermoedden we dat het een Cettis Zanger was, daar we de vogel uit het buitenland zeer goed kenden.

Van de vogel werd de volgende beschrijving gemaakt: Lijkt bij oppervlakkige waarneming op een Snor *Locustella lusciniodes*, maar onderscheidt zich hiervan door opvallende, lichte oogstreep en een wit randje onder het oog. Bovenzijde rossig bruin tot kastanjebruin; buik en borst grijs-vuilwit; poten vleeskleurig aandoend, snavel van boven bruingrijs, onder vleeskleurig. Staart rommelig en sterk afgesleten; onderstaartdekveren als bij Snor met witachtige-lichtbruine toppen. Maten: totale lengte 119 mm, vleugel 54 mm, staart 56 mm, snavel 12 mm, tarsus 22 mm. Van de vleugel was de eerste slagpen langer dan de langste slagpendekveren en de 3e t.e.m. de 6e slagpen hadden een versmalde buitenvlag. Het aantal staartpenen was tien.

Als bewijsmateriaal werden tevens kleurendia's gemaakt.

Dit is de 4e ringvangst en de 10e bevestigde waarneming (zie p.p. 83 van dit *Limosa* nummer, waar deze soort behandeld wordt in de *Ornithologie van Nederland 1969/1970*).

C.N.A.: bevestigde waarneming.

#### SUMMARY

In the reclaimed area South Flevoland a Cetti's Warbler has been ringed. This is the 10th confirmed record for the Netherlands.

Adres: Engelsjan 21, Laren N.H.

### EEN WILGENGORS *EMBERIZA AUREOLA* IN NEDERLAND GEVANGEN EN GERINGD

A Yellow-breasted Bunting *Emberiza aureola* trapped and ringed in the Netherlands

J. H. KLATTE en F. P. J. KOOIJMANS

Op 27 oktober 1971 om 10.40 uur vingen de auteurs op een der banen van het Vogelringstation Meyendel bij Wassenaar een vogel, die zij als een ♂ Wilgengors *Emberiza aureola* in winterkleed determineerden.

De onderzijde van de vogel (keel, borst, buik, flanken en onderstaartdekveren) was geel, behoudens een smalle, donker kastanjebruine band over de borst, gedeeltelijk verdoezeld door de lichte beigekeurige randen der desbetreffende borstveertjes en enkele zwartbruine lengtestrepen op de flanken en de zijkanten van de borst. Het geel van de anaalstreek en de onderstaartdekveren werd naar de staart toe lichter en ging over in wit.

Van de kop waren de kruin en de nek donkerbruin, het bovenste deel van de wangen (oorstreek) vaal zwartachtig met beigebruin erin; daaronder de keel, het overige deel van de wangen en de zijkanten van de hals tot aan

de nek geel. Een lichtbruine wenkbrauwstreep liep tot in de nek en midden op de kruin was een vage, alleen in goed licht te onderscheiden, iets lichtere lengtestreep zichtbaar. Bij het opstrijken van de veertjes op de voorkop en de oorstreek kwam zwart te voorschijn.

De rug was donker kastanjebruin, getekend met enig beige en zwart. De stuit was donkerbruin.

De vleugeldekveren waren kastanjebruin met zwart en beige, de grote en kleine slagpennen zwartbruin. Het voorste deel van de vleugel had een grote, witte vlek, die vooral ook in de vlucht erg opviel en daarachter was een veel smallere, lichte, beige vleugelstreep te zien. In de witte vleugelvlek kwamen enkele lichtgele veertjes voor. De staartveren waren zwartbruin met op de buitenste pennen een schuine, diagonaal verlopende, brede, witte streep, grotendeels op de binnenvlag. De op één na buitenste staartpennen hadden een klein wit vlekje aan het eind.

De poten waren licht, enigszins vleeskleurig bruin. Van de rechterpoot ontbrak de gehele tarsus. De lengte van de vleugel bedroeg 76 mm, het gewicht was 19 gram. De vogel werd geringd (ring Vogeltrekstation Arnhem B 235171) en daarna losgelaten. Hij leek in goede conditie te zijn; het verenkleed was niet afgesleten.

De Wilgengors is broedvogel o.a. van Oost-Finland (onregelmatig), Europees Rusland en Siberië. Dat de soort meer op de trek in West-Europa voorkomt, blijkt uit een waarneming van mei 1969, gedaan door de eerste auteur samen met Mr. J. Kist op een terrein in de buurt van Ganges (Zuid-Frankrijk). De Avifauna van Nederland 1970 p. 89 vermeldt één vondst (10—11 september 1963 Lichtschip Noord-Hinder, Limosa 37: 317) en één onbevestigde waarneming (26 augustus 1962 Oostelijk Flevoland, Limosa 37: 53). Dit is dus de tweede bevestigde waarneming sinds 1900.

C.N.A.: Bevestigde waarneming.

#### SUMMARY

On 27th October 1971 a specimen of male Yellow-breasted Bunting *Emberiza aureola* was trapped at the Vogelringstation Meyendel near Wassenaar, the Netherlands. The bird was ringed and released. This is the second confirmed record of the species since 1900.

Adres: Van Kijfhoeklaan 114, Den Haag.

#### BROEDGEVAL VAN EEN SIJS *CARDUELIS SPINUS* IN HET GOOI

Breeding case of the Siskin *Carduelis spinus*

D. A. JONKERS

Op 13 juli 1971 deelde de heer N. Verlaat mij mee, dat hij op het terrein van de boomkwekerij Jurrissen te Naarden het broeden van een Sijs *Carduelis spinus* had vastgesteld. Hij had al enkele weken Sijzen gehoord en