

## Korte Mededelingen

*VERMOEDELIJKE WAARNEMING VAN DE ARENDBUIZERD (Buteo rufinus). 1)*

In gezelschap van de heer P. Kelder, technisch hoofdambtenaar bij het Staatsbosbeheer, bezocht ik op 13 februari 1963 enige voederplaatsen voor vogels in O. Flevoland. Tijdens die tocht vertelde de heer Kelder mij dat door hem en zijn echtgenote, mevrouw Kelder-Daalter, op 15 jan. '63 in sectie X, kavel: 47, 48 en 49 een roofvogel was waargenomen die in vorm enigszins overeenkwam met de Buizerd of de Ruigpootbuizerd, maar dat het zeer waarschijnlijk een andere soort betrof.

Nadien werd de bewuste roofvogel nog waargenomen door de heer Kelder voornoemd, nu in gezelschap van de heer A. v. d. Berg, assistent bij het Staatsbosbeheer.

Aangekomen in sectie X vestigde de heer Kelder mijn aandacht op een buizerdachtige vogel, die daar stond te wiekelen boven een der eerder genoemde kavels en volgens de heer Kelder wellicht de bewuste „roofvogel” moest zijn. Onze afstand tot de voedselzoekende vogel was echter vrij groot zodat een eventueel onmiddellijk onderkennen van de soort, ook met behulp van de 10 × 50 kijker, vrijwel niet mogelijk was. Wat mij bij dit eerste waarnemen evenwel opviel was de kleur van het gevederde, dat m.i. sterk afweek van dat van Buizerd en Ruigpootbuizerd. Ook de grootte van de vogel alsmede de vorm waren afwijkend van die van beide genoemde soorten. Daar de roofvogel zich echter steeds verder van ons verwijderde, staakten wij het waarnemen en vervolgden onze route. Toen wij ca. 12.30 uur de terugweg aanvaardden en daarbij de eerste waarnemingsplaats naderden, zag ik op het talud van de naast de weg gelegen tocht (kanaal) een vogel staan, die ik aanvankelijk op een afstand van plm. 150 meter voor een Roerdomp hield. Toen we evenwel tot op 30 meter afstand genaderd waren, bleek het geen Roerdomp te zijn, maar zéér waarschijnlijk dezelfde reeds eerder door ons op grote afstand geobserveerde roofvogel. Het waren vooral de kleur en de grootte van de vogel die ons in de eerste aanleg hadden doen denken aan een Roerdomp. Ook de plaats, het talud van de tocht, werkte daartoe enigszins mee. In het korte moment dat wij d.a.v. in de gelegenheid waren de vogel te observeren, concludeerden wij, dat dit exemplaar waarschijnlijk geen Buizerd of Ruigpootbuizerd kon zijn. (Als vergelijkingsmateriaal waren beide laatstgenoemde soorten eveneens in O. Flevoland aanwezig).

De door ons waargenomen bijzonderheden werden als volgt genoteerd:

Afmetingen: groter dan van Buizerd en Ruigpootbuizerd; kop: okergeel; hals: rossig bruin; schouderveren: bruingeel; vleugelbocht: bruingeel; vleugelboeg: isabel tot bruingeel; staart: geheel licht bruin.

(Daar wij bij het observeren in een auto zaten, was het ons helaas niet moge-

<sup>1)</sup> Nog niet beoordeeld door de C.N.A. (Red.).

lijk, tijdens het vrij snel op de wiekengaan van de vogel, de kleur der onderzijde van de vleugel te kunnen waarnemen.)

Algemene indruk: een overwegend „isabel” tot licht rossigbruine vogel. Aan de hand van door ons verrichte waarnemingen en de geraadpleegde literatuur was de waargenomen roofvogel vermoedelijk een exemplaar van de Arendbuizerd.

J. A. F. Koridon.

#### SUMMARY:

*A probable sight-record of the Long-legged Buzzard.*

On February 13th, 1963 a Buzzard was seen in the newly reclaimed Polder of Eastern-Flevoland — a part of the former Zuiderzee — which according to the observers most probably belonged to the species *rufinus*. Till now only two finds are known for the Netherlands.

#### GROTE TRAP (*Otis tarda*) BIJ DE MEERN.

Een telefoontje bracht ons dinsdag 5 maart 1963 ten huize van de heer P. J. Bouwman te Utrecht. Deze bleek sedert een dag in het bezit te zijn van een hem onbekende vogel, die door ons werd gedetermineerd als een wijfje van de Grote Trap. De vogel was er vrij slecht aan toe, als gevolg van een ernstige pootwond. Ze kon niet meer lopen en zelfs niet meer staan. Omdat starten zodoende onmogelijk was geworden, was van vliegen ook geen sprake meer. Dit was de reden, dat een jongen de vogel op 4 maart in de Polder de Hooge Weide, nabij De Meern, had kunnen grijpen; zij werd overgedragen aan de heer Bouwman voornoemd. Deze heeft veel moeite gedaan om de vogel weer op te knappen, helaas tevergeefs. Zelfs de goede zorgen van een dierenarts mochten niet meer baten. Twee dagen later is de vogel gestorven. Zij is daarna overgebracht naar preparateur Verkuijl te Maarssen, die haar voor de heer Bouwman zal opzetten.

Een onderzoek naar de juistheid van de bewering, dat zich in de Polder de Hooge Weide nog een tweede exemplaar zou bevinden, leverde geen 100% zekere gegevens op. Wel werd door ons op 5 maart in genoemde polder op grote afstand even een vogel gezien, die gezien afmetingen en habitus mogelijk een Grote Trap is geweest. Wij slaagden er echter niet in de vogel voldoende dichtbij te zien te krijgen. Dit was evenmin het geval op 7 maart, toen een tweede onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een mededeling van de boerenzoon, die de eerste vogel had gevonden, dat hij op 6 maart weer een exemplaar in de polder had gezien.

A. J. H. Baron van Lynden en S. Braaksmā.  
Naschrift van de Redactie.

In het Maandblad van de „Royal Saint Hubert Club de Belgique” (1963, no. 33: 30, 33 en XII) berichten Lippens en Didier over het vertoeven van 14 Grote Trappen bij Grimbergen en een twaalfstal ten N. van Eeklo, België,

medio februari. Op een der bijgevoegde, door Didier bij Grimbergen gemaakte foto's zijn negen exemplaren zichtbaar (t.K.).

SUMMARY:

*A find of the Great Bustard.*

On March 4th, 1963 a wounded specimen of the Great Bustard was found near De Meern, Province of Utrecht. About half a month earlier two groups of this species, respectively of 14 and 12 specimens, stayed for some days in Belgium (See: Royal Saint Hubert Club de Belgique, March 1963, p. 30, 33 and XII).

*DE GROENPOOTRUITER (Tringa nebularia) ALS OVERZOMERAAR IN DE OMGEVING VAN TERSCHELLING.*

Volgens de gegevens van de heer N. Ruitenbergh (Limosa 36: 115—116) lijkt het onaannemelijk, dat de Groenpootruiter in ons land zou overzomereren. Mijn ervaringen in Zeeland zijn hiermee in overeenstemming. Tevens deel ik de mening van schrijver, dat juli-waarnemingen op trekvogels betrekking hebben.

Op Terschelling meen ik het merendeel van de Groenpootruiters, die in de eerste decade van juni worden gezien, eveneens tot de doortrekkers te moeten rekenen. Daarnaast beschik ik echter over een aantal waarnemingen uit de twee volgende decaden over de periode 1954—1963:

1954: 12 juni, 3 ex. wad Wierschuur.

1955: 22 juni, 7 ex. westzijde Eerste Slenk; 25 juni, 4 ex. wad bewesten Griend.

1956: 27 juni, 1 ex. wad bij Stryp; 30 juni, 2 ex. wad bij Dellewal.

1957: 11 juni, 1 ex. Boschplaatwad bezuiden Tweede Duintjes; 22 juni, 6 ex. Richel bij Vlieland en 4 ex. Posthuiswad Vlieland.

1958: 30 juni, 2 ex. wad bij Oosterend-Terschelling.

1959: 14 juni, 3 ex. Boschplaatwad bezuiden Helmpollen; 24 juni, 4 ex. aldaar; 25 juni, 4 ex. wad bij mosselbanken bezuiden Lies; 27 juni, 3 ex. voor Groene Strand te West-Terschelling; 29 juni, 2 ex. aan rand schor de Ans bezuiden Lies.

1960: 27 juni, 14 ex. wad bezuiden Hoorn-Terschelling.

1961: 16 juni, 1 ex. aan een brakwaterplas bij Stryp.

1962: 11 juni, 1 ex. gehoord boven eendenkooi te Formerum; 19 juni, 3 ex. langs schor de Keag bezuiden Formerum.

1963: 16 juni, 1 ex. Boschplaatwad bezuiden Eerste Duintjes; 20 juni, 5 ex. aldaar; 21 juni, 1 ex. boven de Waddenzee bezuiden Hee; 25 juni, 2 ex. langs een kreek op het wad bezuiden polder Nieuwland.

Op grond van deze waarnemingen ben ik van oordeel, dat de Groenpootruiter althans in de omgeving van Terschelling en Vlieland jaarlijks in zeer klein aantal overzomert.

J. J. C. Tanis.

## SUMMARY:

*On the summering of the Greenshank in the Netherlands.*

Some dates are given about the summering in very small numbers of the Greenshank on the Frisian Isles of Terschelling and Vlieland (contra Limosa 36, p. 115 and 116, first part and Bannerman, The Birds of the British Isles, Vol. XI, p. X). For a few other dates in the surroundings of Kampen, Province of Overijssel, see Limosa 36, p. 116, second part.

*WAARNEMING VAN DE REUZENZWARTKOPMEEUW (Larus ichthyaëtus). 1)*

Nadat de heer G. Klooster, van beroep stucadoor, en ondergetekende op 8 januari 1963 's morgens om 7 uur de wacht bij de lucht-compressor aan de uitmonding van het Ganzediep (Zwarte Meer) hadden betrokken en aldaar bij het kunstmatig gemaakte wakje in het ijs op het Ganzediep voedsel voor de vogels hadden uitgestrooid, vertoefden er bij het wakje om plm. 9.00 uur enige Storm- en Kokmeeuwen. Omstreeks 10 uur in de ochtend — toen wij een daar eveneens aanwezige Waterpieper observeerden — verscheen er boven genoemde voedselplaats plotseling een zéér opvallend grote meeuw. De eerste uitroep van de heer Klooster was dan ook: „Kijk eens wat een grote vogel daar is”. Tot driemaal toe kwam de desbetreffende meeuw tot zéér laag boven het door ons reeds uitgestrooide voedsel vliegen, maar durfde helaas, wellicht door onze aanwezigheid, niet op de voederplaats neer te strijken. De afstand tussen vogel en waarnemers bedroeg minder dan 20 meter.

Naar onze mening was de vogel duidelijk groter dan de Zilvermeeuw, terwijl de kop, hoewel niet diep zwart, bovendien een zeer opvallende donkere kleur had. Voorts toonde de vogel in vorm en vliegbeeld gelijke overeenkomst met een door mij reeds op 24 mei 1946 in de N.O. Polder waargenomen exemplaar van de Reuzenzwartkopmeeuw (zie Limosa 19: 53). Dit was voor mij onder meer een reden bij het eerste waarnemen vrijwel onmiddellijk te verklaren: „Deze vogel kan niet anders dan een Reuzenzwartkopmeeuw zijn.” De vogel had geen donkere eindband aan de staart, dus betrof het wellicht een adult exemplaar.

J. A. F. Koridon.

## SUMMARY:

*New sight-record of the Great Black-headed Gull.*

On January 8th, 1963 one of the three of observers of the only specimen of *Larus ichthyaëtus* ever seen in the Netherlands again watched a Gull in the Zwarte Meer-reserve near Kampen, Province of Overijssel, which according to him certainly belonged to the same species.

<sup>1)</sup> Nog niet beoordeeld door de C.N.A. (Red.).

**WAARNEMING VAN SNEEUWUIL (*Nyctea scandiaca*) IN OOSTELIJK FLEVOLAND.<sup>1)</sup>**

Toen ik op 25 januari 1963, 's middags tussen twee en drie uur, op zoek was naar de Witte Giervalk, die enkele malen in de omgeving van Lelystad zou zijn gezien, zag ik tot mijn verrassing langs de weg die loopt van Swifterbant naar Lelystad een grote, witte uil zitten bovenop een der grote hopen aarde, die daar langs de weg en langs een even van de weg verwijderd kanaal liggen, terzijde van de kavel G 4. Door de grote hoeveelheid sneeuw die er lag kon ik, althans per auto, de vogel niet dichterbij benaderen dan tot op ongeveer zestig meter. Door de zoeker van mijn met een telelens (300 mm) uitgeruste camera, kon ik de vogel echter vrij goed zien. Zonder optische hulpmiddelen was ik er reeds zeker van dat de vogel een Sneeuwuil moest zijn, hoewel ik deze soort nooit eerder had gezien, anders dan op plaatjes. Door de zoeker van de camera zag ik dat de uil, die ik alleen van voren heb kunnen zien, vrij duidelijk getekend was met vrij korte, enigszins gebogen, bruine tot bruingrijze dwarsbandjes. Afgaande op wat hierover in De Nederlandsche Vogels wordt gezegd, meen ik te mogen aannemen dat ik met een vrouwelijk exemplaar te doen heb gehad, of met een jonge vogel. Pogingen om de uil dichterbij te benaderen mislukten, doordat de vogel wegvloog. Het vliegbeeld was zeer duidelijk dat van een uil.

De grootte en de witte kleur van de vogel in aanmerking nemend is vergissing hier naar mijn mening uitgesloten. De veel kleinere Sperweruil, die volgens de literatuur de grootte moet hebben van de in Oostelijk Flevoland veel voorkomende en mij (omdat ik in deze polder woon) zeer goed bekende Velduil, heeft een met zwart omzoomd „gezicht”. Dat had de door mij waargenomen uil niet. De kop was rond en opvallend wit. Vergissing met Oeraluil of Laplanduil is eveneens uitgesloten, omdat deze soorten niet wit, maar grijs of bruingrijs zijn en bovendien overlangs gestreept. J. F. Sollie.

**SUMMARY:***Sight-record of the Snowy Owl.*

On January 25th, 1963 a big white Owl was seen in the new Polder of Eastern Flevoland, which according to the observer beyond all doubt must have been a specimen of the Snowy Owl.

**KANNIBALISME BIJ STEENLOPERS (*Arenaria interpres*).**

In januari en februari 1963 heeft een groot gedeelte van de Steenlopers tussen Camperduin en Callantsoog zich gevoed met vlees van vorstslachtoffers. Hierbij zagen wij meerdere malen, dat ook de Steenlopers door hun levende soortgenoten geconsumeerd werden.

P. Boer en Chr. van Orden.

**SUMMARY:***Cannibalism with Turnstones.*

During the severe frost-period in January and February 1963 Turnstones were frequently observed along the Dutch Northsea-coast consuming the bodies of their dead fellows.

<sup>1)</sup> Nog niet beoordeeld door de C.N.A. (Red.).

*VERSLAG VLIEGTOCHT OVER BIESBOSCH, HOLLANDS DIEP EN HARINGVLIET OP 25 JANUARI 1963.*

Op 25 januari 1963, na ongeveer een maand strenge vorst, was het mij mogelijk een vlucht boven het Zuidhollandse deltagebied te maken met een klein type vliegtuig, „Beaver”, van de Koninklijke Luchtmacht. Allen die mij daarbij terwille waren, wil ik hierbij van harte dankzeggen. De vlucht duurde van 10.30 tot 12.20 uur en had het doel watvogels van voedsel te voorzien. Aangezien boven open water lager dan 100 m werd gevlogen en de snelheid gering was, was het zeer goed mogelijk waar te nemen wat zich in het water ophield. Voor nauwkeurige tellingen ontbrak echter de tijd en ook foto's konden niet worden gemaakt, zodat vrijwel alle gegeven aantallen schattingen zijn.

Op het kaartje is aangegeven welke route is gevolgd; tevens kan men hierop zien waar nog open water was (waargenomen ijsvelden zijn zwart aangegeven). Waargenomen werden:


*Vlaardingse Vlietlanden:* niets.

*Nieuwe Waterweg* bij Vlaardingen: 50—100 Kokmeeuwen.

*Havens Botlekgebied:* niets.

*Binnenbedijkte Maas:* niets.

*Dordtse Kil* bij 's-Gravendeel: niets.



*Zuidhollandse Biesbosch*: niets.

*Brabantse Biesbosch* ten westen van hoogspanningsleiding: 5 Knobbelzwanen; 40 Wilde Eenden (vnl. ♂ ♂).

*Nieuwe Merwede* stroomafwaarts van Kop van 't Land: 150 Nonnetjes; 100 Wilde Eenden; 100 Kuifeenden; 100 Meerkoeten.

*Amer* stroomafwaarts van Drimmelen: 700—1100 Grote Zaagbekken; 500 Wilde Eenden; 75 Brandganzen; 50 Nonnetjes; 40 Kleine of Wilde Zwanen; 10 Meerkoeten.

*Hollands Diep*: 1100 Grote Zaagbekken; 800 Wilde Eenden (op 't ijs); 250—270 Grote Mantelmeeuwen; 110 Nonnetjes; 100 Kuifeenden; 60 Meerkoeten (op 't ijs); 10—20 Zilvermeeuwen; enkele „boeren”eenden; 1 Brandgans; 1 Blauwe Reiger; enkele Toppereenden?

*Volkerak en Krammer* tot Heense Molen: 100 meeuwen met lichte mantel; 10 Grote Zaagbekken; enkele Grote Mantelmeeuwen; enkele Zilvermeeuwen.

*Haringvliet* van Ooltgensplaat tot Middelharnis: 10 Kleine of Wilde Zwanen; 4 Nonnetjes.

*Haringvliet* van Middelharnis tot Noordzee: 400—600 Grote Zaagbekken; 25 Grote Mantelmeeuwen; 15 Zilvermeeuwen.

*Goereese Gat*: niets.

*Brede Water* (niet goed kunnen zien): 500—1000 Meerkoeten; 200 Wilde Eenden; enkele Knobbelzwanen.

*Brielse Gat en De Beer*: niets.

*Mond Nieuwe Waterweg + Havens Europoort*: niets.

*Noordzeekust* van Hoek van Holland tot Kijkduin: 200 Zilvermeeuwen; 100—150 Kuifeenden.

De totaalaantallen voor de verschillende soorten worden dus:

Blauwe Reiger	1	Grote Zaagbek	2200—2800
Kleine of Wilde Zwaan	50	Nonnetje	300
Knobbelzwaan	10	Meerkoet	700—1200
Brandgans	75	Grote Mantelmeeuw	280—300
Wilde Eend	1650	Zilvermeeuw	230—340
Kuifeend	300—360	Kokmeeuw	70—220

Soorten waarop bijzonder is gelet, doch die niet werden waargenomen, zijn: Wintertaling, Middelste Zaagbek en Aalscholver.

Opvallend zijn in het rivierengebied de kleine aantallen Meerkoeten en de grote aantallen Grote Zaagbekken en Grote Mantelmeeuwen.

Van de meeste soorten waren dus slechts kleine aantallen aanwezig; groepen van enige omvang waren zeer opvallend en zullen stellig niet over het hoofd zijn gezien.

W. J. Wolff.

#### SUMMARY:

*Report of a flight above the Province of Southern-Holland during the severe last winter.*

On January 25th, 1963 the author flew above the delta-area of the Province of Southern-Holland. A list is given of the total number of specimens of Wildfowl seen during this trip. For the route see the line (- - - -) on the map.