


mededelingen

Fluitzwaan in Lauwersmeer in november 1986 Op 23 november 1986 om 15:15 ontdekten Frank Dorèl, Gerard van Gool, R de Graaff en A Sterk in het noordoostelijk deel van de Lauwersmeer Gr in een groep van ruim 500 Kleine Zwanen *Cygnus columbianus bewickii* een exemplaar met een zwarte snavel die alleen vlak voor het oog zeer weinig geel vertoonde. De vogel verschilde verder niet van de omringende zwanen. Hij kon goed worden bekeken en een veldschets werd gemaakt. Door de uitzonderlijk kleine hoeveelheid geel op de snavel kon de vogel als Fluitzwaan *C c columbianus* worden gedetermineerd. Evans & Sladen (1980) stelden een significant verschil vast tussen het percentage geel op de snavel van Fluitzwaan (0-15.8%) en Kleine Zwaan (22.9-42%). Het percentage geel op de snavel van onze vogel bedroeg naar schatting 6-9%.



FIGUUR 1 Fluitzwaan *Cygnus columbianus columbianus*, Lauwersmeer, Groningen, november 1986 (Ton Eggenhuizen)

Dit was het derde geval van deze Noordamerikaanse ondersoort voor Nederland. Het eerste geval betrof een vogel die op 15 februari 1976 te Zonnemaire, Schouwen-Duiveland Z, werd gefotografeerd (Mullié 1980). De tweede werd op 7 en 15 februari 1980 waargenomen bij Nijkerk Gld (Slagboom 1987). In beide gevallen werd overigens door de auteurs niet geheel uitgesloten geacht dat de geringe hoeveelheid geel op de snavel geweten kon worden aan melanisme. Sinds 1978 zijn er zeven gevallen van de Fluitzwaan in Ierland, alle van december-maart. De laatste drie waren van de drie opeenvolgende winters van 1985/87 in South Slob, Wexford. Vermoedelijk hadden deze gevallen betrekking op dezelfde vogel, met een andere snaveltekening dan die van de Lauwersmeer (Killian Mullarney in litt; Br Birds 79: 532, 1986). De eerste drie Fluitzwanen in Groot-Britannië werden waargenomen in Somerset en Hampshire, eveneens in de winters van 1985/87; ook hier betrof het mogelijk steeds hetzelfde

de exemplaar (Br Birds 81: 545, 1988). Buiten Nederland en de Britse Eilanden is in Europa alleen een exemplaar vastgesteld op 3 april 1979 in Växjö, Småland, Zweden. (Br Birds 75: 22, 1982).
Wij bedanken Ton Eggenhuizen voor het uitwerken van de veldschets.

summary

TUNDRA SWAN IN LAUWERSMEER IN NOVEMBER 1986 On 23 November 1986, a Tundra Swan *Cygnus columbianus columbianus* was seen in the Lauwersmeer, Groningen. The bird was present in a flock of more than 500 Bewick's Swans *C c bewickii*. The amount of yellow at the base of the black bill was only 6-9%. This fits the range of Tundra (0-15.8%) rather than that of Bewick's (22.9-42 %).

This was the third record of this North American subspecies for the Netherlands. The previous ones were in February 1976 at Zonnemaire, Zeeland, and in February 1980 at Nijkerk, Gelderland. In Europe, it has been recorded for Great Britain (3), Ireland (7) and Sweden (1).

verwijzingen

Evans, M E & Sladen, W J L 1980. A comparative analysis of the bill markings of Whistling and Bewick's Swans and out-of-range occurrences of the two taxa. Auk 97: 697-703.
Mullié, W C 1980. Een Kleine Zwaan met een zwarte snavel. Sterna 24: 78.
Slagboom, T H 1987. Waarneming van een Kleine Zwaan *Cygnus columbianus* met bijna zwarte snavel. Limosa 60: 40-41.

Frank Dorèl, Uilenstede 188, 1183 AP Amstelveen, Nederland
Gerard W J van Gool, Bosscheweg 57, 5151 BB Drunen, Nederland

Slender-billed Curlews in Morocco in February 1979 In recent times, it has become clear that the wetlands on the Atlantic coasts of Morocco are the main wintering grounds of Slender-billed Curlew *Numenius tenuirostris*. The population has declined to the point where this is now probably the rarest migratory bird species in the Western Palearctic (Cramp & Simmons 1983, Urban et al 1986, van den Berg 1988a,b).

In this note, I present the details of my observation of three Slender-billed Curlews at Oued Massa, southern Morocco, on 4 February 1979. The species does not appear to have been previously recorded at this site, and there is only one more recent record known from the entire region south of the Atlas range (Thévenot 1989); this record of seven birds on 7 April 1986 at Oued Massa remains, however, without published documentation. No Slender-billed Curlews were found in the five other Moroccan coastal wetlands (ie, Lac de Sidi-Bourhaba, Merja Zerga, Oued Loukkos, Oued Sebou and Oued Sous) which I surveyed between 24 January and 21 February 1979 (Ewins unpubl. data). At Sidi Rbat, c 40 km south of Agadir, the mouth of Oued Massa has become cut-off from the Atlantic by c 100 m of low dune, resulting in a brackish lake c 6 km long. At the seaward end, the lake is usually shallow and a number of low and muddy islands have formed which are used as roosting and, to a lesser extent, feeding sites by waders, gulls and terns. From 4 to 10 February 1979, there